ARIKÖY TOPLU YAPI YÖNETİMİ

KIŞ MEVSİMLİK ÇİÇEK ÇALIŞMASI

Hazırlayan
ZİRAAT MÜHENDİSİ:Murad Ali DEMİR

İSTANBUL
2009

VİOLA WİTTROCKİANA (MENEKŞE)

- Ekim zamanı: şubat'tan mart'a veya haziran'dan eylül'e kadar yapılır.
- Bol güneşli veya kısmi gölgeli alanları tercih eder.
- Yaz başında çiçek açar.
- Haziran'dan eylül'e kadar ekilirse kışın çiçek açar.
- Bitki boyu 15-20cm.

CYCLAMEN (TAVŞAN KULAĞI)

- Boyu 5-20 cm civarındadır ve Şubat - Nisan aylarında çiçek açar.
- En belirgin özelliği, kalp veya böbrek şeklindeki yapraklarıdır.
- Beş parçalı olan çiçekleri beyaz, pembe ya da koyu pembe renkte olabilir.
- Drenajı iyi olan organik maddece zengin topraklar uygundur.
- Işığı sever ama direk ışık sakıncalıdır.
- Tohumla yada yumru köklerin bölünmesi ile çoğaltılabilir.

PRİMULA VULGARİS
(ÇUHA ÇİÇEĞİ)

- 10-20cm uzayabilen tek bir sap üzerinde güzel kokan çiçekleri vardır.
- Her çayırda orman kenarlarında, fundalıkların altında yetişir.
- İlkbahar çiçeklerindendir.
- Kıştan korkmaz,dayanıklıdır.Tabii türleri Karadeniz ormanlarında çok görülür.
- Nemli,humuslu toprak ve hafif gölgeyi sever.Yazın yaprakları kurusa bile sonbaharda yeniden Sürgünlerinden yeni bitkiler elde edilebilir.

CALENDULA OFFİCİNALİS (BODUR PORTAKAL NERGİSİ)

- Tohum ekimi ilkbaharda yapılır.
- Güneşli alanları tercih eder.
- Yaz mevsimi boyunca çiçek verir.
- Yükseklik 30cm.
- Dışarıya dikim için, fideleri 30-46cm aralıklı olacak şekilde yerleştirin.
- Güneş ışığını tercih ederler ve toprak türlerinin çoğunda büyüyebilirler.

BELLİS PERENNİS
(BODUR PORTAKAL TABAĞI)

- Daima yeşil kalan 2-5 cm uzunluğunda küçük dairesel veya kaşık şeklinde yapraklara sahiptir.
- Çiçek kurulları 2-3 cm çapında, beyaz uzun ve sarı tüplü çiçekleri vardır.
- Tohum ekimi kış sonundan ilkbahar başına dek ekilir.
- Güneşli veya yarı gölgeli bir yere 23cm arayla dikin.
- İlkbaharda çiçek açar.
- Yükseklik 15cm.

CHRYSANTHEMUM (KASIMPATI)

- Katmerli hemen hemen her renkte çiçekleri ve top formlu varyeteleri vardır.
- Gün uzunluğunun 12 saatten az olduğu zamanlarda çiçek açar.
- İyi drenajlı hafif topraklar uygundur.
- Bol ışıklı ve güneşli ortamları sever.
- Üretimi çeliklerle yada yaşlı bitkileri bölerek yapılır.

BRASSİCA ALERACEA
(SÜS LAHANASI)

- İlk kış donlarından sonra en güzel şeklini alır.
- Yapraklar kıvrımlı, pembe, mor ve morumsu yeşil renktedir.
- Güneşli ve açık alanlarda, az miktarda kireç ilave edilmiş, zengin, ayrıca derin işlenmiş topraklarda iyi gelişmektedir.
- Minimum sıcaklık isteği -15 °C'dir.
- Tohumlar Temmuz-Ağustos aylarında 2 kısım tınlı toprak, 1 kısım torf karışımına ekilir.
- 15-18"C lerde 7-10 gün içerisinde çimlenir.
- Park ve bahçelerde Ekim-Kasım aylarında 20-40 cm aralık ve mesafelerle dikilirler.

TULİPA (LALE)

- 6 adet renkli taç yaprağı vardır.
- Kumla karıştırılmış hafif bahçe toprağında yetişebilir.
- Yarı gölge ortamları sever bol ışıklı ortamlarda yaprakları zarar görebilir.
- Çiçeklenme 16-18 derece arasında başlar.
- Dikim için rüzğardan korunaklı yerler tercih edilmelidir.
- Üretimi, yaz aylarında, çiçeklenmeden hemen sonra yumru köklerinin ayrılması suretiyle olur.

TEŞEKKÜRLER