

AECHMEA



Kullanılışı: Güzel çiçekli, dekoratif yapraklı bir bitkidir.

Toprak: Humusça zengin yada topraksız karışım uygundur.

Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında 3 haftada bir kompoze gübre verilir.

Sulama: Toprak hafif nemli tutulur. Yaprak rozetine su verilmelidir. Yağmur suyu yâda kalsiyumsuz su kullanılmalıdır.

Işık: Bol ve direk ışıklı ortamlarda iyi gelişir.

Sıcaklık: Kışın minimum 12 °C olmalı aksi halde rozetler çürür.

Hava: Yazın bol ve temiz hava gerekir. Hava nemi sık sık sprey ile sağlanır.

Saksı değiştirmek: Çiçeklenme sonrası bitkinin yaşamı sona erir.

Üretim: Çiçeklenme sonrası çıkan yan sürgünlerden üretilir.

AGLAONEMA



Kullanılışı: Dekoratif yapraklı, yarı gölge ortamlarda kullanılabilen bir bitki.

Toprak: Topraksız karışım yada drenajı iyi, organik maddece zengin bir harç uygundur.

Gübreleme: Mart-Eylül her hafta bir kez yapraklı bitki gübresiyle sulanmalıdır. Kışın ayda bir gübre verilmelidir.

Sulama: Harç sürekli olarak nemli tutulmalı, kışın verilen su miktarı azaltılmalıdır.

Işık: Direkt ışığı sevmez yarı gölge yada dolaylı ışık alan yerler uygundur.

Sıcaklık: Yazın 21–25 °C, kışın 18 °C altına düşmeyen sıcaklıkta iyi gelişir.

Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever. Bu nedenle özellikle yaz aylarında yapraklarına su püskürtmek faydalıdır.

Saksı değiştirmek: Hızlı gelişen bir bitki olduğundan her yıl erken ilkbaharda saksı değiştirilmelidir.

Üretim: Bitkinin uç yada yan sürgünlerinden alınan yeşil çeliklerle, gözlü yaprak çelikleri ya da havada daldırma ile üretilir.

ALOE VARİEGATA



Kullanılışı: İdeal ev bitkisidir. Gelişme dönemi kıştır. Çiçeklenme Mart ve Temmuz arasındadır.

Toprak: İyi drenajlı kumlu bahçe toprağı uygundur.

Gübreleme: Her iki haftada bir gübre solüsyonu ile sulanır.

Sulama: Kış ve ilkbahar dönemlerinde normal su verilmeli. Yazın nispeten kuru tutulmalıdır.

Işık: Tam güneş ışığı ister.

Sıcaklık: Normal oda sıcaklığı uygundur. Yazın olabildiğince serin yerde tutulmalıdır.

Hava: Kuru havayı sever kaloriferli evler için uygundur.

Saksı değiştirmek: Birkaç yılda bir çiçeklenmeden sonra büyük olmayan saksılara aktarılır.

Üretim: Yan sürgünler veya yaprak çelikleriyle yapılır.

ANTHURIUM



Kullanılışı: Dekoratif bir iç mekân süs bitkisidir.

Toprak: Çok hafif gevşek yapılı bir karışım uygundur.

Gübreleme: Şubat-Aralık arası her hafta çiçekli bitki gübresi verilmelidir.

Sulama: Sık sık sulanmalıdır. Yağmur suyunu sever.

Işık: Yarı ve tam gölge ortamlar uygundur. Direkt ışık zararlıdır.

Sıcaklık: Yazın 18–20 °C, kışın 15 °C altına düşmeyen sıcaklıkta iyi gelişir.

Hava: Hava nemini arttırmak için bitkiyi sık sık sprey ile sulamak gerekir.

Saksı değiştirmek: İlkbaharda saksısı değiştirilmelidir.

Üretim: Gövde çelikleri ve ayırma yöntemi ile çoğaltılır.

APHELANDRA



Kullanılışı: Sıcak ve nemli yerlerde başarıyla yetiştirilir.

Toprak: Organik maddece zengin iyi bahçe toprağından hoşlanır.

Gübreleme: Haftada bir kez gübreli solüsyonla sulanmalıdır.

Sulama: Yazın toprak yüzeyi daima nemli olacak şekilde sulanmalıdır. Kışın verilen su miktarı azaltılmalıdır.

Işık: İyi ışık alan veya yarı gölge yerleri sever

Sıcaklık: Ortalama yıl boyunca 22 °C de iyi yetişir.

Hava: Yüksek derecede hava nemi ister

Saksı değiştirmek: Her yıl erken ilbaharda yapılmalıdır.

Üretim: Sürgün çelikleriyle üretilir.

ARAUCARIA



Kullanılışı: Geniş salonlarda kullanılacak çok gösterişli değerli bir bitkidir.

Toprak: Besin maddece zengin drenajı iyi standart saksı harcı uygundur.

Gübreleme: İlkbahar ve yaz aylarında 2 haftada bir kompoze veya yaprak gübresi verilmelidir.

Sulama: Yapraklara su püskürtülmelidir. İlkbahar ve yazın harç bolca kireçsiz su ile sulanmalıdır.

Işık: Aydınlık ve yarı gölge ortamlar uygundur.

Sıcaklık: 16–20 °C sıcaklıklar uygundur.

Hava: %60–70 oransal nem uygundur.

Saksı değiştirmek: Her 2–3 yılda bir erken ilbaharda yapılır.

Üretim: Tohumla yâda tepe çelikleriyle yapılır.

CALATHEA



Toprak: Topraksız karışım yâda torf, kum, çiftlik gübresi karışımı harç iyidir.

Gübreleme: Haziran-Eylül her hafta bir kez yapraklı bitki gübresiyle sulanmalıdır. Kışın ayda bir gübre verilmelidir.

Sulama: Haziran-Eylül arası bitki bol bol sulanmalıdır. Yapraklarına sık sık su püskürtülmelidir.

Işık: Yaz aylarında yarı gölge, kış aylarında aydınlık yerlerde bulundurulmalıdır.

Sıcaklık: Gelişme dönemlerinde 23°C, kışın 13–16 °C ihtiyaç duyar.

Saksı değiştirmek: Her yıl şubat mart aylarında yapılmalıdır.

Üretim: Rizomların ayrılması ile yapılır.



CAPSICUM ANNUUM

Kullanılışı: İç mekanların dekorasyonunda tek olarak yada diğer bitkilerle birlikte kullanılır.

Toprak: Standart saksı harcı uygundur..

Gübreleme: Yazın gübre solüsyonları ile sulanmalıdır.

Sulama: Harç sürekli nemli olacak şekilde sulanmalıdır.

Işık: Çiçeklenme ve meyve oluşum dönemlerinde sürekli ışık ister.

Sıcaklık: Sıcak ortamlarda iyi gelişir.

Saksı değiştirmek: Her yıl yeniden üretildiğinden saksı değiştirmeye gerek yoktur.

Üretim: Şubat ayında tohumla yapılır.

CROTON



Kullanılışı: Tropik bir bitkidir yüksek orantılı nemi sever.

Toprak: Topraksız karışım uygundur organik maddece zengin karışım uygulanmalıdır.

Gübreleme: Mart-Eylül her hafta bir kez yapraklı bitki gübresiyle sulanmalıdır.

Sulama: Harç sürekli olarak nemli tutulmalı, kışın verilen su miktarı azaltılmalıdır.

Işık: Direk ışığı sevmez yarı gölge yâda dolaylı ışık alan yerler uygundur.Fazla gölge yerlere konulursa yaprak rengini kaybeder.

Sıcaklık: Yazın 21–25 °C, kışın 18 °C altına düşmeyen sıcaklıkta iyi gelişir.

Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever. Bu nedenle özellikle yaz aylarında yapraklarına su püskürtmek faydalıdır.

Saksı değiştirmek: Erken ilkbaharda yapılır.

Üretim: Hava daldırma veya yeşil çeliklerle üretilir.

COLEUS



Toprak: Torf ilave edilmiş normal bahçe toprağı uygundur.

Gübreleme: Yıl boyunca yapraklı bitki gübresi ile gübrenmelidir..

Sulama: Yazın sık sık, kış aylarında daha az sulamak gerekir.

Işık: Tam veya direk ışık alan yerleri sever.

Sıcaklık: Normal oda sıcaklığı, kışın en az 15 °C olmalıdır.

Hava: Sıcak havalarda sprey sulama yapılmalıdır.

Saksı değıştirmek: Şubat ayında yapılmalıdır.

Üretim: Otsu veya yeşil çeliklerle çoğaltılır.

DİEFFENBACHIA



Kullanılışı: Geniş bir yerde koyu gölgede bile yetişir..

Toprak: Topraksız karışım veya iyi bahçe toprağı ile karıştırılmış humuslu toprak uygundur.

Gübreleme: Mart-Ekim arası yapraklı bitkiler için hazırlanmış gübre solüsyonu ile sulanmalıdır.

Sulama: Yazın bol su nemden hoşlanır,kışın suyu azaltılmalıdır.

Işık: Direk ışığı sevmez yarı gölge yâda dolaylı ışık alan yerler uygundur.

Sıcaklık: Yazın 20–25 °C, kışın 15 °C altına düşmeyen sıcaklıkta iyi gelişir.

Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever. Bu nedenle özellikle yaz aylarında yapraklarına su püskürtmek faydalıdır.

Saksı değiştirmek: Her sene ilkbaharda yapılmalıdır.

Üretim: Çelik ve hava daldırma ile çoğaltılabilir.

DRACAENA



Kullanılışı: Alaca yaprakları ile çok dekoratif bir salon bitkisidir.

Toprak: Torf, kum, yaprak çürüntüsü karışımında yetiştirilir.

Gübreleme: Gelişme döneminde 15 günde bir gübrenmelidir. Fazla gübreleme yaprağın alacasının yok olmasına neden olur.

Sulama: Gelişme döneminde bol su verilmeli. Oransal nemi düşük yerlerde yapraktan su püskürtülmelidir.

Işık: Yarı gölge yerlerde bulundurulmalıdır.

Sıcaklık: Yazın 22–24 °C, kışın 12–15 °C olmalıdır.

Üretim: Çelik hava daldırma ve tohumla yapılır.

EUPHORBIA PULCHERRIMA



Kullanılışı: Kışın veya Noel de satılan mevsimlik bir bitkidir.

Toprak: Topraksız karışım yâda torf, kayın yaprağı, çam yaprağı karışımı uygundur. Temel gübre olarak kemik unu ilave edilebilir.

Gübreleme: Haziran-Ekim arası her hafta çiçekli gübre solüsyonu verilir. Gübreyi çok seven bir bitkidir.

Sulama: Yazın toprak devamlı nemli tutulur, ılık su verilmelidir.

Işık: Yazın yarı gölgeyi sever.

Sıcaklık: Normal oda sıcaklığında (18–20 °C) tutulmalıdır.

Hava: Nemli havayı sever. Yazın sık sık sprey ister.

Saksı değiştirmek: Mayısta saksı değişimi yapılır.

Üretim: Tepe sürgünleri ile çoğaltılır.

FİCUS BENJAMİN



Kullanılışı: Büyük geniş salonların dekorasyonu için elverişlidir.

Toprak: Drenajı iyi standart saksı harcında yetişebilir.

Gübreleme: Kışın dinlenme dönemi hariç yapraklı bitkiler için hazırlanan gübrelerden verilmelidir.

Sulama: İlkbahar ve yazın sürekli sulanmalı. Kışın sulama azaltılmalıdır.

Işık: İyi ışık alan ancak sürekli direk ışığa maruz kalan yerlerde bulunmamalıdır.

Sıcaklık: Genellikle sıcaklığı sever kışın sıcaklık 16 °C nin altına inmemelidir.

Hava: Yapraklar üzerine biriken tozlar sık sık alınmalıdır..

Saksı değiştirmek: İki yılda bir erken ilkbaharda yapılmalıdır .

Üretim: Çelik ve hava daldırma ile yapılır.

MARANTHA



Kullanılışı: Hafif gögeli pencereler için iyi bir ss bitkisidir.

Toprak: Topraksız karışım humuslu yaprak çrnts ve ahır gbresi karışımı ideal yetiřtirme ortamıdır.

Gbreleme: Nisan-Ağustos arası her iki haftada bir yapraklı bitki gbresi ile sulanmalıdır.

Sulama: Toprak daima nemli tutulmalıdır.

Iřık: Direk iřığı sevmez yarı glge yda dolaylı iřık alan yerler uygundur.

Sıcaklık: Yazın 21–25 °C, kışın 18 °C altına dřmeyen sıcaklıkta iyi geliřir.

Hava: Oransal nemi yksek ortamları sever. Bu nedenle zellikle yaz aylarında yapraklarına kireçsiz su pskrtmek faydalıdır.

Saksı deęiřtirmek: řubatta saksısı deęiřtirilmelidir.

retim: Ayırma yntemi ile çoęaltılır.

MONSTERA



Toprak: Torf lu veya kumlu normal bahe toprađında yetiřtirilir.

Gübreleme: Marttan ekime kadar yapraklı bitkiler için hazırlanan gübre solüsyonu ile 15 günde bir sulanmalıdır.

Sulama: İlbahar ve yazın sürekli sulanmalı. Kışın sulama azaltılmalıdır.

Iřık: Gölge veya yarı gölge yerleri sever.

Sıcaklık: Normal oda sıcaklığında tutulmalıdır.

Hava: Kuru ve sıcak havaya dayanıklıdır. Ancak yazın yapraklara sprey şeklinde su püskürtmek yararlıdır.

Saksı deđiřtirmek: 3–4 yılda bir yapılmalıdır.

Üretim: elik ve hava daldırma ile yapılır.

PUNİCA GRANATUM



Kullanılışı: Aşılı varyeteleri evde iyi sonuç verir.

Toprak: Topraksız karışım yaprak çürüntüsü ahır gübresi ve tınlı toprak karışımı uygundur.

Gübreleme: Mart-Ağustos arası her hafta bir kez çiçekli bitki gübresiyle sulanmalıdır.

Sulama: Yazın bol su verilir. Mart ekim arası daha kuru tutulur.

Işık: Tam güneş ışığı ister.

Sıcaklık: Yazın havadar bir pencerede tutulur.Kışın en az 8 °C olmalıdır.

Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever. Bu nedenle özellikle yaz aylarında yapraklarına su püskürtmek faydalıdır.

Saksı değiştirmek: Şubat mart aylarında yapılır.

Üretim: Çelikle üretilir.

SANSEVIERIA



Toprak: Standart saksı harcı veya topraksız karışım uygundur.

Gübreleme: Mart-Eylül arası haftada bir kez yapraklı bitkiler için hazırlanan gübre solüsyonu ile sulanmalıdır.

Işık: Tam gün ışığı veya çok parlak ışıklı yerleri sever.

Sıcaklık: Normal oda sıcaklığı ister.

Saksı değiştirmek: Gerektiği zaman ilkbaharda yapılmalıdır.

Üretim: Ayırma ve yaprak çelikleriyle çoğaltılır.

SCHEFFLERA



Toprak: Standart saksı harcı veya topraksız karışım uygundur.

Gübreleme: Büyüme döneminde haftada bir yaprak gübresine ihtiyaç gösterir.

Sulama: Büyüme döneminde bol, kışın daha az su verilir.

Işık: Aydınlık, yarı gölge veya hafif güneşli ortamlar uygundur.

Sıcaklık: 15–21 °C sıcaklıklar uygundur.

Hava: Oransal nemi yüksek yerlerde iyi gelişir.

Saksı değiştirmek: Her 2–3 yılda bir nisan ayında değiştirilir.

Üretim: Tohumla, tepe çelikleriyle ve hava daldırma ile yapılır.

SPATHİPHYLLUM



Kullanılışı: Çiçeklenme mevsimi dışında taze yeşil yapraklı dekoratif bir bitkidir.

Toprak: Topraksız karışım veya normal saksı harcı uygulanır.

Gübreleme: Mart-Eylül aylarında sıvı bitki gübresi ile sulanmalıdır. Fazla gübre kahverengi yaprak ucu yapabilir.

Sulama: Yazın toprak daima nemli tutulur, kışın daha az sulanır.

Işık: Kuzeye bakan odalar için uygundur çok ışık istemez.

Sıcaklık: Normal oda sıcaklığı uygundur. Kışın 15°C den az olmamalıdır.

Hava: Kuru odaya toleranslıdır.

Saksı değiştirmek: Şubat-Mart saksısı değiştirilmelidir.

Üretim: Ayırma yöntemi ile çoğaltılır

YUCCA



Kullanılışı: Geniş salonlarda tek yâda grup içinde kullanılabilir.

Toprak: Torf, yaprak çürüntüsü ve kum ile hazırlanmış harç kullanılır.

Gübreleme: Mayıs-Eylül ayları arasında 2 haftada bir yaprak gübresi verilir.

Sulama: Mayıs-Eylül bol su verilmeli, yapraklarına her gün su püskürtülmelidir. Ekim-ocak aylarında verilen su miktarı azaltılmalıdır.

Işık: Direk ışık şartları arayan, ışık istekleri fazla olan bir bitkidir.

Sıcaklık: Gelişme döneminde 23–25 °C, dinlenme döneminde 12–15 °C sıcaklığa ihtiyaç duyar.

Hava: Oransal nemi yüksek ortamları sever.

Saksı değiştirmek: Genç bitkileri her yıl yaşlı bitkileri 3 yılda bir nisan ayında yapılır.

Üretim: Ayırma ve gövde çelikleriyle üretilir.